

ORVOSI ESZKÖZ ÚTMUTATÓJA



ENTEROSGEL® GYOMOR- BÉLRENDSZERI ADSZORBENS IBS-SSEL ÖSSZEFÜGGŐ AKUT ÉS KRÓNIKUS HASMENÉS ESETÉN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSA

ENTEROSGEL®

- 225 g-os tubusban
- 90 g-os tubusban
- 15 g-os tasakban
(10 tasakos csomagolás)

JAVASOLT ALKALMAZÁS

Az ENTEROSGEL® az irritábilis bél szindrómával (IBS) összefüggő akut és krónikus hasmenés tüneti kezelésére javallott orális szuszpenzió.

HATÁSMECHANIZMUS

Az ENTEROSGEL® orális bélszorbens (enterszorbens). A szervez ásványi alapú készítmény képes adszorbeálni bizonyos toxikus és káros anyagokat a bélben (pl. endotoxinokat és enterotoxinokat). Ezeket fizikailag megköti a felületén, ily módon csökkentve a székletürítés gyakoriságát és lerövidítve a hasmenés időtartamát. A széklettel együtt távozó ENTEROSGEL® eltávolítja a szervezetből a megköti toxikokat és káros anyagokat, aminek jótékony hatása lehet az IBS-sel összefüggő akut és krónikus hasmenés javallott állapotainak kezelésekor.

Összetétel: a polymethylsiloxane polyhydrate (a metil-kovász hidrogél) – 70%, tisztított víz – 30%. Az ENTEROSGEL® nem tartalmaz tartósítószer, színezéket, glutént, zsírt, cukrot, laktózt, izesszítószer, sem növényi vagy állati eredetű összetevőt.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

- Az ENTEROSGEL® készítményt étkezés vagy egyéb száján át szedett gyógyszerek alkalmazása előtt vagy után 2 órával vegye be.
- Az ENTEROSGEL® akut hasmenés esetén 3–5 napig, krónikus hasmenés esetén akár 21 napig is alkalmazható.
- A bevenni kívánt adagot oldja fel szobahőmérsékletű vízben.
- A tasak csak közvetlenül a felnyitás után alkalmazható. A tasak tartalmát oldja fel vízben.
- A tubus a felnyitástól számított 30 napig használható.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA ÉS ADAGOLÁS

Gyermekek:

1–3 éves korban az ENTEROSGEL® alkalmazása előtt tanácsos kikérni az orvos véleményét.

1–6 év: 5 g (körülbelül 1 teáskanál vagy 1/3 tasak) 50–100 ml vízben feloldva naponta 3-szor.

7–14 év: 10 g (körülbelül 2 teáskanál vagy 2/3 tasak) 50–100 ml vízben feloldva naponta 3-szor.

15 év feletti gyermekek és felnőttek: 15–22,5 g (körülbelül 1 leveleskanál vagy 1–1,5 tasak) 200 ml vízben feloldva naponta 3-szor.

A kezelés kezdetén (az 1. napon) az első adag a kétszeresére növelhető, és minden székelés után újabb egyszeri adag adható, naponta 3–6 alkalommal. Az adagok maximális száma az első napon 8.

- Ha 1-2 napig nincs széklete, akkor szakítsa meg az ENTEROSGEL® alkalmazását, növelje a folyadékvételeit, és a következő széklet után folytassa a kezelést.
- Krónikus hasmenés kezelésekor a széklet állagának és a székelés gyakoriságának megfelelően módosíthatja az adagolást. Híg széklet esetén akár kétszeres adag is alkalmazható napi 3 alkalommal, normál széklet esetén pedig naponta egyszeri 1 adag is elegendő lehet. A napi 6 adagot ne lépje túl.

ELLENJAVALLATOK

Ne alkalmazza az ENTEROSGEL®

- készítményt:
- ha egyéb, módosított (szabályozott) felszívódási gyógyszert is szed száján át;
- ha bélpanaszban (bélcsavarodás miatti súlyos hasmenésben) vagy bélzáródásban szenved; vagy
- a készítmény szembeli intolerancia esetén (a korábbi alkalmazás alapján).

ISMERT MELLÉKHATÁSOK

Székrekedés, hányinger.

TERHESSÉG ÉS SZOPTATÁS

Az ENTEROSGEL® alkalmazható terheség és szoptatás alatt. Amennyiben a terheség vagy szoptatás alatt nem érzí jól magát, tanácsos orvoshoz fordulni.

MEGLŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

Az ENTEROSGEL® befolyásolhatja egyes száján át szedett gyógyszerek

felszívódását. Az ENTEROSGEL® készítményt **egyéb száján át szedett gyógyszerek alkalmazása előtt vagy után 2 órával vegye be.** Ha egyéb gyógyszert is szed, az ENTEROSGEL® alkalmazásával kapcsolatban érdemes kikérni orvosa vagy gyógyszerésze véleményét.

- Az ENTEROSGEL® száján át, étkezés között alkalmazandó.
- Hoszsan tartó hasmenés esetén az ENTEROSGEL® alkalmazása előtt orvoshoz kell fordulni az alapbetegség diagnosztizálás érdekében.
- Gyermekek esetén a hasmenés kezelését a szervezet dehidratálódásának megelőzése érdekében időben egészítse ki orális folyadékpótló oldattal alkalmazásával.
- Felnőttek esetén ajánlott az ENTEROSGEL® kezelést orális folyadékpótló oldattal bevitelével kiegészíteni a megfelelő hidratálás biztosítása érdekében.
- Amennyiben a hasmenéses tünetek nem szűnnek meg, feltétlenül forduljon orvoshoz.
- Láz, véres széklet, dehidratálódás jelei, 24 órán belül hat vagy több széklet, egyidejű hasmenés és hányás, illetve erős vagy állandó hasfájás esetén mielőbb forduljon orvoshoz, különösen gyermekek esetében.
- Az ENTEROSGEL® terméknek a terheség első trimeszterében történő alkalmazására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre klinikai adatok. Az ENTEROSGEL® alkalmazása előtt kérje ki orvosa véleményét.
- A lejárt ideje után ne alkalmazza a készítményt.
- Ha a készítmény csomagolása megsérült, akkor ne alkalmazza.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ne lépje túl az ajánlott adagot.
- A vitamin-, illetve tápanyaghiányos állapot megelőzése érdekében ne lépje túl a kezelés ajánlott időtartamát, és ne alkalmazza a készítményt étkezéskor.
- Ha egyidejűleg egyéb bélszorbent, például aktívszén-, agyag- vagy kaolintartalmú készítményt is alkalmaz, akkor kérje ki orvosa véleményét. Orvosa azt tanácsolhatja, hogy a másik készítményt ne alkalmazza az ENTEROSGEL® termékkel együtt.
- Az ENTEROSGEL® alkalmazása nem javallott akut gyógyszermegezés,

gyógyszermegezés vagy gyógyszer-túlادagolás esetén.

Tasak

- A felnyitott tasak csak egyszer alkalmazható.
- A tasakot csak közvetlenül a felnyitás után alkalmazza.
- A mikrobás szennyeződés megelőzése érdekében ne alkalmazza újra a részlegesen felhasznált tasakokat.

Tubus

- Felnyitás és minden használat előtt jól rázza fel a tubust.
- Az Enterosgel kinyomáskor kis mennyiségű folyadék is távozhat a tubusból vagy a tasakból.
- Felnyitás és minden használat után szilárdan zárja vissza a tubus kupakját a kiszáradás és a mikrobás szennyeződés megelőzése érdekében.
- A tubus csak a felnyitástól számított 30 napig használható.

A KÉSZÍTMÉNY TÁROLÁS:

- A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után az ENTEROSGEL® készítményt tilos alkalmazni.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Az ENTEROSGEL® 4 és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
- Óvja a fagytól.
- Óvja a túl magas hőmérsékletől és a közvetlen napfénytől.
- A csomagoláson feltüntetett lejárati idő a megfelelően tárolt, bontatlan termékre érvényes.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A felhasználálatlan ENTEROSGEL® ártalmatlanítása nem igényel különleges intézkedést. A készítmény biztonságosan a háztartási hulladékba dobható. A csomagolás újrahasznosítható.

Kiszereles: orális szuszpenzió 225 g-os tubusban, 90 g-os tubusban vagy 15 g-os tasakban (10 tasakos csomagolás).

Eltarthatóság: három év. A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után nem alkalmazható.

Az ENTEROSGEL® készítményvel kapcsolatos kérdéseit a következő e-mail-címre küldheti: info@enterosgel.hu.

A jelen használati útmutató egyéb nyelvű változatai megtalálhatók a www.enterosgel.eu címen.

**A csomagoláson feltüntetett
szimbólumok magyarázata:**



Minőségmegőrzési idő



Tételszám



Gyártó



Kérjük, olvassa el a használati útmutatót



Hőmérséklet-tartomány



Tanúsított orvosi eszköz



Eldobható csomagolás



A használt csomagolást helyezze egy megfelelő hulladékgyűjtő tartályba.



A csomagolás újrahasznosítható.



A csomagolásért be lett fizetve a megfelelő illeték a meghatalmazott csomagolóvállalat számára.



Óvja a közvetlen napfénytől



Gyártó:

Bioline Products

Bioline Products s.r.o.,
Krakovská 1338/10,
110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság
e-mail: info@enterosgel.eu
www.enterosgel.eu
Ügyfélszolgálat: +420 800 414 005



Magyarországi Forgalmazó:

Anima-Terra Kft.
Budapest, 1121 Ágnes út 25.
www.enterosgel.hu

TUBUSOS ENTEROSGEL®



TASAKOS ENTEROSGEL®



ADAGOLÁS

Életkor	Adag	Gyakoriság
Gyermek 3–6 év	5 g (≈ 1 tejkarote)	3-szor naponta
	vagy 1/3 tasak	
Gyermek 7–14 let	10 g (≈ 2 teáskanál)	3-szor naponta
	vagy 2/3 tasak	
15+ és felnőttek	15–22,5 g (≈ 1 leveskanál)	3-szor naponta
	1–1,5 tasak	

ENTEROSGEL®

Orvosi eszköz



0088